

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Animales de compañía

Analgésicos y **Anti-inflamatorios**

- COX-II
- KiroPred





Antibióticos en Suspensión y Tabletas

- Azitrokir M
- KiroDroxil
- Quiroflox
- KiroSulf-T
- KiroXilina

08



Línea Hospitalaria

- ▶ COX-II
- KiroDroxil
- KiroXilina
- Marboflox



Antimicrobianos

- KiroStop-D
- Metrazol
- ▶ Toltrafin

13



Antiséptico Desinfectante

KiroSeptic Spray



Dermatológicos Tópicos

KiroDerm

- KetoXiderm
- KiroSeb
- KiroDermal
- KiroBencil
- KiroNazol



Dermatológicos Orales

- Ciclomun Oral
- Terbinafin





Cardiológicos



CardioBendan





Desparasitantes Internos

- Kir-Anthel Puppies
- Kir-Anthel
- Kir-Anthel MAX Suspensión
- Kir-Anthel MAX



Estimulantes del Apetito y Gastroentéricos

- BioEst-3V
- Gastrozol
- N-Emesis



Fragancias Kirón

Dreams Aqua

Mistery Active

Mistery Home

Secrets Active

Secrets Home





28



Perfect Dog Clean

Toallitas limpiadoras de:

PERFECTDO

- Lágrimas
- Orejas
- Dientes y encías



Ectoparasiticidas

Shampoo y Jabón insecticida

30 @



Línea Oftálmica

- KirOftal AzitroKir
- KirOftal Genta
- KirOftal CiproXyn
- KirOftal Tobra
- LagriVet SC
- LagriVet
- KirOftal Dexa
- KirOftal KiroPred
- KirOftal Diclo



- Ciclosporin Ungüento
 - KirOftal Ciclosporin
 - KirOftal NeoDex

38



Óticos

- KirOtic 4L
- KiroSeptic Complete



Suplementos Nutricionales

- Performance Calcio
- Performance Condroprotector Vitaminado
- Performance Age's
- Performance Reconstituyente



Especialidades



- Deter Coprofagia
- Dental Plus







NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-005, 006, 007, 008, 021



Indicaciones:

COX II: Es un antiinflamatorio no esteroidal con actividad analgésica y antipiretica, útil en el tratamiento de los procesos traumaticos de Caninos y Felinos.

Dosis: Caninos Inicio: 0.2 mg/kg de peso. Felinos Inicio: 0.3 mg/kg de peso. Caninos y Felinos Mantenimiento: 0.1 mg/kg de peso.



COX II Inyectable

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
Caninos Inicio: 1 ml por cada 25 kg de peso.		Cada ml contiene: Meloxicam5 mg Vehículo c.b.p1 ml Frasco de 10 ml.
C. Mantenimiento: 1 ml por cada 50 kg de peso.		
Felinos Inicio: 1 ml por cada 16 kg de peso.	24 horas	
F. Mantenimiento: 1 ml por cada 50 kg de peso.		



COX II Suspensión

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación		
Caninos Inicio: 15 gotas por cada 7.5 kg de peso.		Cada ml contiene: Meloxicam1.5 mg		
Felinos Inicio: 15 gotas por cada 5 kg de peso.	24 horas	Vehículo c.b.p		
Caninos y Felinos Mantenimiento:15 gotas por cada 15 kg de peso.				



COXII

COX II 1 mg

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación	
Caninos Inicio: 1 tab. por cada 5 kg de peso.		Cada tableta contiene: Meloxicam1 mg	
C. Mantenimiento: 1 tab. por cada 10 kg de peso.			
Felinos Inicio: 1 tab. por cada 3.3 kg de peso.	24 horas	Excipiente c.b.p. 1 tableta Frasco con 30 Tabletas.	
F. Mantenimiento: 1 tab. por cada 10 kg de peso.		Tradeo com ou rabicias.	



COX II 2.5 mg

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación	
Caninos Inicio: 1 tab. por cada 12.5 kg de peso.		Cada tableta contiene:	
C. Mantenimiento: 1 tab. por cada 25 kg de peso.	0 0.0.0.	Meloxicam 2.5 mg	
Felinos Inicio: 1 tab. por cada 8.3 kg de peso.	24 horas		
F. Mantenimiento: 1 tab. por cada 25 kg de peso.		Traces con co labicias.	



COX II 4 mg

	200.0			
Caninos Inicio: 1 tab. por cada 20 kg de peso.				
C. Mantenimiento: 1 tab. por cada 40 kg de peso.				
Felinos Inicio: 1 tab. por cada 13.3 kg de peso.				
F. Mantenimiento: 1 tab. por cada 40 kg de peso.				
Tiempo	Tiempo Fórmula/Presentación			
cada 24 horas	Cada tableta contiene: Meloxicam			

Vía de Administración:

COX II Inyectable: Subcutánea o intravenosa lentamente. COX II Suspensión, 1 mg, 2.5 mg y 4 mg: Oral.





Indicaciones:

KiroPred: Metabolito activo de la prednisona con potente efecto glucocorticoide, útil en perros y gatos para tratar un amplio rango de enfermedades endocrinológicas, músculo-esqueléticas, inflamatorias y condiciones de enfermedad autoinmune.

Dosis: Antiinflamatoria: 0.5-1 mg/kg de peso. Inmunosupresora: 2 mg/kg de peso.



KiroPred 5

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
Antiinflamatoria: Una tableta por cada 6 -12 kg de peso.		Cada tableta contiene: Prednisolona 6 mg
Inmunosupresora: Una tableta por cada 3 kg de peso.	12 horas	Excipiente c.b.p1 tableta Frasco con 20 Tabletas.



KiroPred 20

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
Antiinflamatoria: Una tableta por cada 20-40 kg de peso.	cada	Cada tableta contiene: Prednisolona20 mg
Inmunosupresora: Una tableta por cada 10 kg de peso.	12 horas	Excipiente c.b.p1 tableta Frasco con 20 Tabletas.



KiroPred 50

Dosis	Tiempo			
Antiinflamatoria: Una tableta por cada 50-100 kg de peso.		Cada tableta contiene: Prednisolona 50 mg		
Inmunosupresora: Una tableta por cada 25 kg de peso.	12 horas	Excipiente c.b.p1 tableta Frasco con 20 Tabletas.		

Vía de Administración:

KiroPred 5, 20 y 50: Oral.



AzitroKir M

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-025, 026, 027, 028



Indicaciones:

AzitroKir M: Está indicado en Caninos y Felinos para el tratamiento de infecciones respiratorias causadas por Bordetella spp., Chlamydia spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., Shigella spp., E. coli, Staphylococcus aureus. En infecciones en piel, causadas por Corynebacterium spp., Staphylococcus aureus, S. intermedius, E. coli, Streptococcus spp. y Pasteurella multocida.

Dosis:

Inicial en Caninos y Felinos e Infecciones Dérmicas: 10 mg/kg de Azitromicina y 0.1 mg/kg de Meloxicam.



AzitroKir M Suspensión

A CELLIO COLLINO COLO POLICIO CI.			
Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación	
Dosis: 1 ml por cada 4 kg de peso.			
Caninos Inicio: De 1 a 5 días.	Cada ml contiene:		
Infecciones Dérmicas: De 5 a 7 días.	cada 24 horas	Molovicam 0 1 ma	
Felinos Inicio: De 3 a 5 días.		Frasco con 30 ml.	
Infecciones Dérmicas: Dar por 5 días.			

AzitroKir M 100



	Tiempo	Fórmula/Presentación
Dosis: 1 tableta por cada 10 kg de peso.		
Caninos Inicio: De 1 a 5 días.		Cada tableta contiene: Azitromicina100 mg
Infecciones Dérmicas: De 5 a 7 días.	cada 24 horas	Meloxicam1 mg Excipiente c.b.p 1 tableta
Felinos Inicio: De 3 a 5 días.	24110103	1 tableta Frasco con 6 Tabletas.
Infecciones Dérmicas: Dar por 5 días.		Traded con a rabicias.

AzitroKir M 200

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación	
Caninos Inicio: 1 tableta por cada 20 kg de peso durante 1 a 5 días.		Cada tableta contiene: Azitromicina 200 mg Meloxicam 2 mg Excipiente c.b.p	
Infecciones Dérmicas: 1 tableta por cada 20 kg de peso durante 5 a 7 días.	24 horas		

AzitroKir M 400





■Kirón

Dosis							
Caninos durante			leta p	or	cada	40 kg	de peso
	- /		2 1				10 1

Infecciones Dérmicas: 1 tableta por cada 40 kg de peso durante 5 a 7 días.

Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas	Cada tableta contiene: Azitromicina 400 mg Meloxicam 4 mg Excipiente c.b.p. 1 tableta Frasco con 6 Tabletas.



AzitroKir M Suspensión, 100, 200 y 400: Oral.











Indicaciones:

KiroDroxil: Contiene cefadroxilo una cefalosporina semisintética de primera generación, con efecto bactericida de amplio espectro. Esta indicado en infecciones respiratorias, cutáneas, tejidos blandos, genitourinarias, oído medio e interno, osteomielitis, discoespondilitis y poliartritis bacterianas.

Dosis: 10 - 20 mg/kg de peso.

KiroDroxil 200

	Dosis
Caninos Inicio: 1 tableta por cada 10 - 20 kg de peso.*	
Pioderma Profundo: Se recomienda hasta 90 días.**	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 8 - 12 horas durante 5 - 7 días	Cada tableta contiene: Cefadroxilo monohidrato 200 mg Excipiente c.b.p

KiroDroxil 400

	Dosis
Caninos Inicio: 1 tableta por cada 20 - 40 kg de peso.*	
Pioderma Profundo: Se recomienda hasta 90 días.**	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 8 - 12 horas durante 5 - 7 días	Cada tableta contiene: Cefadroxilo monohidrato 400 mg Excipiente c.b.p

^{*}Para infecciones crónicas hasta 5 días después de la desaparición de los signos clínicos.

Vía de Administración:

KiroDroxil 200 y 400: Oral.



Indicaciones:

Quiroflox: Se recomienda para otitis externa, septicemias, enterobacterias, prevención y tratamiento de osteomielitis, infecciones de la piel, urogenitales, respiratorias, prostáticas y en heridas. Posee efecto post-antibiótico sobre Staphylococcus intermedius, Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Pasteurella multocida, Escherichia coli, Salmonella typhimurium y Rickettsia rickettsi. Contiene enrofloxacina micronizada, que permite una mejor absorción digestiva, biodisponibilidad, penetración tisular más rápida y mejor liposolubilidad. Actúa contra bacterias Gram-positivas, Gram-negativas, Micoplasma spp., y algunas Rickettsias.

Dosis: 5 - 10 mg/kg de peso.

Quiroflox

	Dosis
Caninos y Felinos: 1 ml por cada 5 kg de peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas durante 5 - 7 días	Cada ml contiene: Enrofloxacina25 mg Vehículo c.b.p1 ml Frasco de 30 ml.

Quiroflox 50

	Dosis
Caninos y Felinos: Una tableta por cada 10 kg de peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas durante 5 - 7 días	Cada tableta contiene: Enrofloxacina 50 mg Excipiente c.b.p

Quiroflox 150

	Dosis
Caninos y Felinos: Una tableta por cada 30 kg de peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas durante 5 - 7 días	Cada tableta contiene: Enrofloxacina

Vía de Administración:

Quiroflox Solución, 50 y 150: Oral.



^{**}De preferencia administrarlo acompañado con alimento.

KiroSulf-T

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-004









Indicaciones:

KiroSulf-T: Es un antimicrobiano de amplio espectro indicado en el tratamiento de infecciones ocasionadas por gérmenes Gram-positivos y Gram-negativos susceptibles a la combinación de Sulfametoxazol con Trimetoprim. Actúa contra infecciones del tracto respiratorio, tracto digestivo y vías urinarias.

Dosis: 15 - 30 mg/kg de peso.

KiroSulf-T

	Dosis	
Caninos: 5 ml por cada 15 kg de peso.		
Felinos: 1.5 ml por cada 5 kg de peso.		
Tiempo	Fórmula/Presentación	
cada 12 horas	Cada 100 ml contienen: Sulfametoxazol	

Vía de Administración:





Indicaciones:

KiroXilina: Es un antibiótico semisintético del grupo de las tetraciclinas de amplio espectro, que actúa contra bacterias Gram-positivas, Gram-negativas, aerobias y anaerobias. Controla bien las enfermedades causadas por rickettsias, *Ehrlichiosis canina*, clamidias y micoplasmas. De igual forma está indicada para el tratamiento de infecciones: del tracto respiratorio (rinitis, amigdalitis y bronconeumonía); del sistema urogenital (cistitis, metritis y prostatitis); de la piel (dermatitis supurativas, abscesos y heridas infectadas).

Se puede utilizar también para el tratamiento de: gastroenteritis, otitis, pododermatitis, leptospirosis, anaplasmosis, diarrea y profilaxis en el post-operatorio.

Dosis: 10 mg/kg de peso corporal.

KiroXilina 100

	Dosis
Caninos y F de 3 a 5 día	elinos: 1 tableta por cada 12 kg de peso Is.
Ehrlichiosis Canina: 1 tableta por cada 12 kg de peso de 10 a 14 días.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas	Cada tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina 120 mg Excipiente c.b.p 1 tableta Frasco con 30 Tabletas.

KiroXilina 400

	Dosis	
Caninos y Fe	elinos: 1 tableta por cada 40 kg de peso.	
Casos Agúd	os: De 3 a 5 días.	
Casos Cróni	cos: De 10 a 14 días.	
Ehrlichiosis Canina: 1 tableta por cada 40 kg de peso de 10 a 14 días.		
Tiempo	Fórmula/Presentación	
cada 24 horas	Cada tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina 400 mg Excipiente c.b.p 1 tableta Frasco con 20 Tabletas.	

Vía de Administración:

KiroXilina 100 y 400: Oral.





NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-005, 006, 007



Indicaciones:

COX-II: Es un antiinflamatorio no esteroidal con actividad analgésica y antipirética, útil en el tratamiento de los procesos traumaticos de Caninos y Felinos.

Dosis: Caninos Inicio: 0.2 mg/kg de peso. Felinos Inicio: 0.3 mg/kg de peso. Caninos y Felinos Mantenimiento: 0.1 mg/kg de peso.



COX-II 1 mg

	Dosis	
Caninos Inic	cio: 1 tableta por cada 5 kg de peso.	
Felinos Inici	o: 1 tableta por cada 3.3 kg de peso.	
D. Mantenimiento: 1 tableta por cada 10 kg de peso.		
Tiempo	Fórmula/Presentación	
cada 24 horas	Cada tableta contiene: Meloxicam 1 mg Excipiente c.b.p. 1 tableta Caja con 100 Tabletas.	

COX-II 2.5 mg

Caninos Inicio: 1 tableta por cada 12.5 kg de peso.		
Felinos Inicio	Felinos Inicio: 1 tableta por cada 8.3 kg de peso.	
D. Mantenimiento: 1 tableta por cada 25 kg de peso.		
Tiempo	Fórmula/Presentación	
cada 24 horas	Cada tableta contiene: Meloxicam 2.5 mg Excipiente c.b.p. 1 tableta Caja con 100 Tabletas.	



COX-II 4 mg

	Dosis	
Caninos Inic	cio: 1 tableta por cada 20 kg de peso.	
Felinos Inicio: 1 tableta por cada 13.3 kg de peso.		
D. Mantenimiento: 1 tableta por cada 40 kg de peso.		
Tiempo	Fórmula/Presentación	
cada 24 horas	Cada tableta contiene: Meloxicam 4 mg Excipiente c.b.p. 1 tableta Caja con 100 Tabletas.	

Vía de Administración:

Cox-II 1, 2.5 y 4 mg: Oral.









Indicaciones:

KiroDroxil: Contiene cefadroxilo, una cefalosporina semisintética de primera generación, con efecto bactericida de amplio espectro. Esta indicado en infecciones respiratorias, cutáneas, tejidos blandos, genitourinarias, oído medio e interno, osteomielitis, discoespondilitis y poliartritis bacterianas.

Dosis: 10 - 20 mg/kg de peso.

KiroDroxil 200

Dosis		
Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 10 - 20 kg de peso.		
Tiempo	Fórmula/Presentación	
cada 8 - 12 horas durante 5 - 7 días	Cada tableta contiene: Cefadroxilo Monohidrato 200 mg Excipiente c.b.p 1 tableta Caja con 100 Tabletas.	

KiroDroxil 400

Dosis			
Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 20 - 40 kg de peso.			
Tiempo	Fórmula/Presentación		
cada 8 - 12 horas durante 5 - 7 días*	Cada tableta contiene: Cefadroxilo monohidrato400 mg Excipiente c.b.p		

- * Para infecciones crónicas hasta 5 días después de la desaparición de los signos clínicos.
- ** De preferencia administrarlo con alimento.

Vía de Administración:

KiroDroxil 200 y 400: Oral.



Indicaciones:

KiroXilina: Es un antibiótico semisintético del grupo de las tetraciclinas de amplio espectro que actúa contra bacterias Gram-positivas, Gram-negativas, aerobias y anaerobias, controla bien las enfermedades causadas por *Ehrlichiosis canina*, clamidias y micoplasmas. De igual forma está indicada para el tratamiento de infecciones: del tracto respiratorio (rinitis, amigdalitis y bronconeumonía), del sistema urogenital (cistitis, metritis y prostatitis); de la piel (dermatitis supurativas, abscesos y heridas infectadas).

Se puede utilizar también para el tratamiento de: gastroenteritis, otitis, pododermatitis, leptospirosis, anaplasmosis, diarrea y profilaxis en el post-operatorio.

Dosis: 10 mg/kg de peso corporal.

KiroXilina 100

Dosis Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 12 kg de peso. Ehrlichiosis canina: 10 mg/kg cada 24 hrs, durante 10 - 14 día			
		Tiempo	Fórmula/Presentación
		cada 24 horas durante 3 - 5 días*	Cada tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina 120 mg Excipiente c.b.p 1 tableta Caja con 100 Tabletas.

KiroXilina 400

	Dosis
Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 40 kg de peso. Ehrlichiosis canina: 10 mg/kg cada 24 hrs, durante 10 - 14 c	
cada 24 horas durante 3 - 5 días*	Cada tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina 400 mg Excipiente c.b.p 1 tableta Caja con 100 Tabletas.

^{*}En los casos agudos y hasta 10 días en casos crónicos. Administrar junto con alimentos.

Vía de Administración:

KiroXilina 100 y 400: Oral.







Indicaciones:

Marboflox: Indicado en el tratamiento de: Infecciones resistentes en piel (como intértrigo, foliculitis, impétigo, forunculosis, pioderma profundo), en infecciones de tejidos blandos, del tracto urinario superior e inferior, del tracto respiratorio. Es eficaz contra bacterias Gram-positivas (en particular Staphylococcus, Streptococcus) y Gram-negativas como (Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Citrobacter freundii, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Morganella morganii, Proteus spp., Klebsiella spp., Shigella spp., Pasteurella spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Pseudomonas spp., Brucella canis así como Mycoplasma spp.).

Dosis: 2 mg por kg de peso.

Marboflox 5 mg

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 2.5 kg de peso.	cada 24 horas durante 5 días*	Cada tableta contiene: Marbofloxacina

Marboflox 20 mg

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 10 kg de peso.	cada 24 horas durante 5 días*	Cada tableta contiene: Marbofloxacina

Marboflox 80 mg

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 40 kg de peso.	cada 24 horas durante 5 días*	Cada tableta contiene: Marbofloxacina

^{*}O a criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración:

Marboflox 5, 20 y 80 mg: Oral.



NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-031





Indicaciones:

KiroStop-D: Antidiarreico y antimicrobiano de amplio espectro, útil en infecciones causadas por microorganismos Gram-positivos, Gram-negativos como Escherichia coli, Pasteurella spp., Klebsiella spp., Pseudomona spp., Proteus spp., Campylobacter spp., Vibrio spp., Treponema spp. y Clostridium spp., así como en algunas infecciones por protozoarios: Trichomonas, Isospora, Eimeria, micoplasmas y riquettsias sensibles a la acción de la fórmula. Empleado específicamente como coadyuvante para el testamiento do diversas digregas talas como: mecánicas virales y hacterianas aquidas y en los el tratamiento de diversas diarreas tales como: mecánicas, virales y bacterianas, agudas y en los casos que se desee disminuir la motilidad intestinal de los mismos.

Dosis: Gentamicina 2.4 mg/kg de peso corporal, Sulfametoxazol 20 mg/kg de peso corporal, Trimetoprim 4 mg/kg de peso corporal y Loperamida 0.1 mg/kg de peso corporal.

KiroStop-D







KiroStop-D: Oral.





Metrazol

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-076, 077, 082





Indicaciones:

Metrazol: Antimicrobiano e inmunomodulador. Medicamento de elección contra infecciones por *Giardia* spp. en cachorros. Util cuando se presentan diarreas y flatulencias producidas por microorganismos bacterianos sensibles a la fórmula. Así mismo, se recomienda en caso de síndrome de intestino corto, infecciones anaerobias de la cavidad oral, encefalopatía hepática, colangitis y enfermedad inflamatoria intestinal.

Dosis: Giardia spp.: 25 mg/kg de peso.

Enfermedad intestinal inflamatoria: 10 - 15 mg/kg de peso.

Metrazol Suspensión

	Dosis	
Caninos y Felinos (Giardia spp.): 1 ml por cada kg de peso.		
Caninos Enf. Intestinal: 1 ml por cada 1.6 - 2.5 kg de peso.		
Tiempo	Fórmula/Presentación	
cada 12 horas durante 5 - 7 días	Cada ml contiene: Metronidazol	

Metrazol 250

		Dosis	
	Caninos y Felinos (Giardia spp.): 1 tableta por cada 10 kg de peso.**		
Caninos Enf. Intestinal: 1 tableta por cada 16.6 - 25 kg de p		ntestinal: 1 tableta por cada 16.6 - 25 kg de peso	
	Tiempo	Fórmula/Presentación	
	cada 12 horas durante 5 - 7 días	Cada ml contiene: Metronidazol 250 mg Excipiente c.b.p 1 tableta Frasco de 14 Tabletas.	

Metrazol 500

Descripción		
Giardia spp. C de peso.***	Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 20 kg	
Caninos Enf. I	ntestinal: 1 tableta por cada 33.3 - 50 kg de peso	
Tiempo	Fórmula/Presentación	
cada 12 horas durante 5 - 7 días	Cada ml contiene: Metronidazol 500 mg Excipiente c.b.p 1 tableta Frasco de 14 Tabletas.	

- *O 50 mg/kg de peso cada 24 horas durante 5 días (2 ml por cada kg).
- **O 50 mg/kg de peso cada 24 horas durante 5 días (2 tabletas por cada 10 kg).
- ***O 50 mg/kg de peso cada 24 horas durante 5 días (1 tableta por cada 10 kg).

Vía de Administración:

Metrazol Suspensión, 250 y 500: Oral.

Toltrafin

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-061, 073, 083





Indicaciones:

Toltrafin: Se recomienda para el tratamiento y la prevención de la coccidiosis. Es una triazina que tiene efecto contra protozoarios. Se dirige a la cadena respiratoria mitocondrial del protozoario susceptible; en concentraciones más altas, también bloquea la formación de pirimidinas.

Dosis: 10 - 20 mg/kg de peso.

Toltrafin Suspensión

·		
Dosis		
Caninos y Felinos: 1 ml por cada 2.5 kg de peso. Hepatozoon en Caninos: 14 mg/kg cada 24 horas, durante 7 día		
		Tiempo
Dosis única o repetir a los 7, 14 ó 21 días.*	Cada ml contiene: Toltrazuril	

Toltrafin 200 mg

Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 10 - 20 kg de peso. Cachorros: Administrar desde los 20 días de edad en criaderos de alta infestación.			
		Tiempo	Fórmula/Presentación
		Dosis única o repetir a los 7, 14 ó 21 días.*	Cada tableta contiene: Toltrazuril

Toltrafin 400

Descripción		
Caninos y Feli	Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 20 - 40 kg de peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación	
Dosis única o repetir a los 7, 14 ó 21 días.*	Cada tableta contiene: Toltrazuril	

^{*}A criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración:

Toltrafin Suspensión, 200 mg y 400: Oral.



KiroSeptic Spray





Indicaciones:

KiroSeptic Spray: Es un antiséptico de uso tópico cutáneo para el lavado y desinfección de heridas. Actúa contra bacterias, hongos y levaduras. Se usa en infecciones cutáneas localizadas, ocasionadas por heridas, quemaduras y eczemas. En el tratamiento de piodermas debe usarse en conjunto con terapia antimicrobiana.

Dosis:

KiroSeptic Spray

	Dosis
Caninos y Felinos: Atomice directamente sobre el área afectada.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
de 2 - 3 veces al día hasta el control de las lesiones.*	Cada 100 ml contienen: Digluconato de Clorhexidina 2 g Vehículo c.b.p

*El tratamiento puede durar de días a semanas a criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración:

KiroSeptic Spray: Tópica cutánea exclusivamente.





NÚMERO DE REGISTRO Q-7972-183











Indicaciones:

KetoXiderm está indicado en el tratamiento de dermatitis bacterianas y micóticas de la piel asociada con: Staphylococcus intermedius, Staphylococcus spp., Malassezia pachydermatis (Pityrosporum), así como el tratamiento de infecciones por dermatofitos ocasionadas por Microsporum canis, Microsporum gypseum y Trichophyton mentagrophytes en perros y gatos.

Modo de Uso: Aplique sobre el pelaje mojado, dando masaje hasta producir espuma, déjelo actuar por 5 a 10 minutos y enjuague con abundante agua. Evite el contacto con los ojos.

KetoXiderm

Tiempo	Fórmula/Presentación
De 2 a 3 baños por semana, durante 4 semanas.*	Cada 100 ml contienen: Gluconato de Clorhexidina

^{*}Después un baño cada 8 días hasta corregir el problema.

Vía de Administración:

KetoXiderm: Tópica.



KiroSeb

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-150



KiroDermal

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-009 010





Indicaciones:

KiroSeb está indicado en dermatitis seborreica oleosa, para remover escamas, exceso de grasa, hongos y bacterias que producen mal olor y prurito. Se usa en perros como desengrasante y calmante previo al tratamiento con insecticidas contra sarna demodécica.

Modo de Uso: Aplique sobre el pelaje mojado, dando masaje hasta producir espuma, déjelo actuar por 5 a 10 minutos y enjuague con abundante agua. Evite el contacto con los ojos.

KiroSeb

Tiempo	Fórmula/Presentación
De 2 a 3 baños por semana, durante 4 semanas.*	Cada 100 ml contienen: Gluconato de Zinc

^{*}Después un baño cada 8 días hasta corregir el problema.

Vía de Administración:

KiroSeb: Tópica.





Indicaciones:

KiroDermal Shampoo y Jabón está indicado para problemas de la piel como: dermatitis, pioderma, seborrea y eczemas. De acuerdo a los componentes de la fórmula es considerado como un antibacteriano y antiprurítico. Reduce las reacciones alérgicas cutáneas, así como la inflamación de la piel. Actúa como exfoliante, antiséptico y astringente. Produce un efecto calmante y posee acción humectante e hidrata la piel evitando la resequedad. Mejora el brillo y sedosidad del pelaje.

Modo de Uso: Moje el pelo de la mascota y aplique dando un suave masaje con movimientos circulares hasta formar abundante espuma, espere de 5 a 10 minutos y enjuague con abundante agua. Repita la operación en caso de ser necesario.

KiroDermal Shampoo

Tiempo	Fórmula/Presentación
De 2 a 3 baños por semana, durante 4 semanas.*	Cada 100 ml contienen: Triclosán

KiroDermal Jabón

Tiempo	Fórmula/Presentación
De 2 a 3 baños por semana, durante 4 semanas.*	Cada 100 g de jabón contienen: Triclosán

^{*}Después un baño cada 8 días hasta corregir el problema.

Vía de Administración:

KiroDermal Shampoo y Jabón: Tópica.



Kiro Bencil

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-149







Indicaciones:

KiroBencil funciona como astringente queratolítico, cicatrizante y drenador folicular. Está indicado para el tratamiento de: prurito, seborrea, pioderma superficial, pioderma secundario profundo, pioderma crónico, acné Felino y Canino, costras, escamas y sindrome de comedones. Funciona como auxiliar en infecciones por *Staphylococcus intermedius*. Mejora el brillo y la sedosidad del pelaje. Es un producto de uso seguro y no altera la humedad de la piel.

Modo de Uso: Agite el producto antes de usar. Moje el pelo de la mascota y aplique Kirobencil dando un suave masaje con movimientos circulares hasta formar abundante espuma, espere de 5 a 10 minutos y enjuague con abundante agua. Repita la operación en caso de ser necesario.

KiroBencil

Tiempo	Fórmula/Presentación
De 2 a 3 baños por semana, durante 1 - 2 semanas.*	Cada 100 ml contienen: Peróxido de Benzoilo

*Usar durante 1 - 2 semanas dependiendo de la gravedad del caso o a criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración:

KiroBencil: Tópica.



Indicaciones:

KiroNazol esta indicado en el tratamiento de la dermatitis micóticas de la piel, asociadas con dermatofitos, levaduras y hongos dimórficos entre los que se encuentran *Blastomyces* spp., Coccidioides spp., Cryptococcus spp., Histoplasma spp., Microsporum spp., y Trichophyton spp.

Modo de Uso: Aplique sobre el pelaje mojado, dando masaje hasta producir espuma, déjelo actuar de 5 a 10 minutos y enjuague con abundante agua. Evite el contacto con los ojos.

KiroNazol

Tiempo	Fórmula/Presentación
De 2 a 3 baños por semana, durante 4 semanas.*	Cada 100 ml contienen: Ketoconazol

^{*}Después un baño cada 8 días hasta corregir el problema.

Vía de Administración:

KiroNazol: Tópica.





Anatomía

de la piel en caninos y felinos





Costra: Piodermia y Pénfigo

Disqueratosis

Malassezia



Collarete

Pústula: **Impétigo**



Sarcoptes



Demodex







Foliculitis Superficial































Dermatológicos Orales



Contenido neto: 20 Tabletas

CICLOMUN Oral

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-140



Indicaciones:

Ciclomun Oral es un inmunosupresor, auxiliar en el tratamiento de dermatitis atópica, forunculosis anal, algunos casos de asma crónica en gatos. Para el tratamiento de enfermedades autoinmunes como anemia hemolítica inmunomediada y lupus cutáneo.

Dosis: 5 mg/Kg de peso.

Ciclomun Oral

	Dosis	
Caninos y Felinos: 1ml por cada 20 Kg de peso.*		
Tiempo	Fórmula/Presentación	
cada 24 horas durante 30 días**	Cada ml contiene: Ciclosporina A	

*Se puede dividir la dosis en dos tomas por día. Se recomienda administrar una hora antes o dos horas después de la ingesta de alimentos.

**O hasta observarse la disminución de signos clínicos pudiendo modificar la dosis a criterio del Médico Veterinario y la respuesta clínica.

Vía de Administración:

Ciclomun Oral: Oral.

Terbinafin NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-142



Indicaciones:

Terbinafin: Útil para el tratamiento de las infecciones dermatofíticas y otras infecciones fúngicas. Tiene actividad contra Microsporum spp., Trichophyton spp., Candida spp., Aspergillus, Blastomyces e Histoplasma.

Dosis: 30 mg por cada kg de peso.

Terbinafin

Kirón

(P 9 5)

USO VETERINARIO

Terbinafin

TABLETAS

Antimicótico

Dosis	
Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 10 kg de peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas*	Cada tableta contiene: Terbinafina

*La dosificación y duración del tratamiento dependerá del criterio del Médico veterinario.

Vía de Administración:

Terbinafin: Oral.









NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-160,161



Cardio dendan









Indicaciones:

Cardio Bendan se recomienda en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva canina, causada por cardiomiopatía dilatada o insuficiencia valvular (regurgitación de la válvula mitral y/o tricúspide). Permite aumentar la fuerza de contracción del corazón.

Segura: 0.2 – 0.6 mg/kg cada 24 hrs. Recomendada: 0.5 mg/kg cada 24 hrs.



Cardio Bendan 1.25

	Dosis	
Caninos y F	Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 2.5 kg de peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación	
cada 24 horas	Cada tableta contiene: Pimobendan	

*Se puede dividir la dosis en dos tomas por día. Se recomienda administrar una hora antes o dos horas después de la ingesta de alimentos.

Cardio Bendan 5

Dosis	
Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 10 kg de peso.*	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas	Cada tableta contiene: Pimobendan 5 mg Excipiente c.b.p 1 tableta Frasco con 60 Tabletas.

*Se puede dividir la dosis en dos tomas por día. Se recomienda administrar una hora antes o dos horas después de la ingesta de alimentos.

Vía de Administración:














ANATOMÍA DEL CORAZÓN EN

CANINOS Y FELINOS



- Flujo eléctrico
- 👚 Flujo de sangre oxigenada
- ★ Flujo de sangre no oxigenada

Kir-Anthel Puppies

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-064







Indicaciones:

Kir-Anthel Puppies: Es una suspensión antiparasitaria efectiva para cachorros y perros de razas pequeñas, para el tratamiento y prevención de parásitos adultos, fases larvarias y huevos de nematodos y amebiasis intestinal.

Se puede utilizar en cachorros desde las 2 semanas de edad, administrando cada 2 semanas y hasta los 2 meses de edad, dependiendo del riesgo de reinfestación por la leche materna y la contaminación ambiental, a criterio del Médico Veterinario.

Dosis: 15 mg de Febantel y 14.5 mg de Pamoato de Pirantel por kg de peso.

Kir-Anthel Puppies 25 ml

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
Caninos y Felinos: 1 ml por cada kg de peso.	cada	Cada ml contiene: Febantel15 mg Pamoato de Pirantel14.5 mg
Giardiasis: 1 ml por cada kg de peso por 2 o 3 días.	24 horas	Vehículo c.b.p1 ml Frasco de 25 ml.

Kir-Anthel Puppies 200 ml

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
Caninos y Felinos: 1 ml por cada kg de peso.	cada	Cada ml contiene: Febantel
Giardiasis: 1 ml por cada kg de peso por 2 o 3 días.	24 horas	



Kir-Anthel Puppies: Oral.





Kir-Anthel

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-062 063 084









Indicaciones:

Kir-Anthel: Es un desparasitante de amplio espectro, para el tratamiento y la prevención de nematodos (gusanos redondos) en sus fases adultas, larvarias y de huevos, cestodos (tenias) y protozoarios (amibas) de los perros.

Contiene tres principios activos sinérgicos: Febantel, Pamoato de Pirantel y Prazicuantel que actúan contra los siguientes géneros: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Strongyloides spp., Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Giardia spp., Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia multiceps, Taenia spp. y Mesocestoides spp.

Dosis:

Kir-Anthel 2.5 Tabletas

All Allies 2.0 radicios			
Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación	
Caninos: 1 Tableta por cada 2.5 kg de peso.	Dosis única a criterio del Médico Veterinario	Cada tableta contiene: Febantel	

Kir-Anthel 10 Tabletas

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
Caninos: 1 Tableta por cada 10 kg de peso.	Dosis única	Cada tableta contiene: Febantel
Giardiasis: 1 Tableta por cada 10 kg de peso por 2 o 3 días.	cada 24 horas	Prazicuantel

Kir-Anthel 35 Tabletas

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación	
Caninos: 1 Tableta por cada 35 kg de peso.	Dosis única	Cada tableta contiene: Febantel	
Giardiasis: 1 Tableta por cada 35 kg de peso por 2 o 3 días.	cada 24 horas	Prazicuantel 175 mg Excipiente c.b.p 1 Tableta Caja con 10 Tabletas.	

Vía de Administración:

Kir-Anthel 2.5, 10 Y 35: Oral.













Indicaciones:

Kir-Anthel MAX Suspensión: Antiparasitario de amplio espectro, para el tratamiento y la prevención de nematodos (gusanos redondos) en sus fases adultas, larvarias y de huevos, cestodos (tenias) y protozoarios (amibas) que afectan a Caninos y Felinos.

Contiene Febantel, Pamoato de Pirantel y Toltrazuril que actúan contra Toxocara canis, Toxascaris leonina, Strongyloides spp., Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Dipylialium caninum, Multiceps multiceps, Taenia spp., Mesocestoides spp., Sarcocystis auc heniae y S. lamacanis. Se puede utilizar en cachorros desde las 6 semanas de edad.

Dosis: 15 mg de Febantel, 14.5 mg de Pamoato de Pirantel, 15 mg de Toltrazuril por kg de peso.

Kir-Anthel MAX Suspensión 25 ml

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
Caninos y Felinos: 1 ml por cada kg de peso.*	Dosis única/cada	Cada ml contiene: Febantel 15 mg Pamoato de Pirantel 14.5 mg
Giardia: 1 ml por cada kg de peso por 2 o 3 días.	24 horas	Toltrazuril

Kir-Anthel MAX Suspensión 200 ml

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
Caninos y Felinos: 1 ml por cada kg de peso.*	Dosis única/cada	Cada ml contiene: Febantel15 mg Pamoato de Pirantel14.5 mg
Giardia: 1 ml por cada kg de peso por 2 o 3 días.	24 horas	Toltrazuril

^{*}Se recomienda una segunda toma 15 días después para cortar el ciclo biológico del parásito.

Vía de Administración:

Kir-Anthel MAX Suspensión: Oral.



Kir-Anthel MAX

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-151, 152, 153



Indicaciones:

Kir-Anthel MAX: Antiparasitario de amplio espectro, para el tratamiento y prevención de nematodos (gusanos redondos) en sus fases adultas, larvarias y de huevos, cestodos (tenias), protozoarios (amibas) y coccidios que afectan a Caninos y Felinos.

Contiene Febantel, Pamoato de Pirantel, Prazicuantel y Toltrazuril que actúan contra los siguientes géneros: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Strongyloides spp., Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Dipylidium caninum, Multiceps multiceps, Taenia spp., Mesocestoides spp., Sarcocystis aucheniae y S. lamacanis., Isospora ohioensis, I. canis, I. burrowsi, Hammondia heydorni, Hepatozoon canis, Cryptosporidium parvum, Sarcocystis spp., Neospora caninum, Isospora spp., Cystoisospora felis y Toxoplasma gondii (fase sexual intestinal, control epidemiológico).

Dosis: Febantel 15 mg/kg, Pamoato de Pirantel 14.5 mg/kg, Prazicuantel 5 mg/kg, Toltrazuril 15 mg/kg.

Kir-Anthel MAX 2.5 Tabletas

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
Caninos y Felinos: 1 Tableta por cada 2.5 kg de peso.*	Dosis única	Cada tableta contiene: Febantel

Kir-Anthel MAX 10 Tabletas

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
Caninos y Felinos: 1 Tableta por cada 10 kg de peso.*	Dosis única	Cada tableta contiene: Febantel

Kir-Anthel MAX 30 Tabletas

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
Caninos: 1 Tableta por cada 30 kg de peso.*	Dosis única	Cada tableta contiene: Febantel


*En infestaciones por Nematodos y Cestodos repetir la dosis a los 14 o 21 días si la carga parasitaria del medio ambiente es alta. La dosificación y duración del tratamiento es a criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración:

Kir-Anthel MAX 2.5, 10 y 30: Oral.



Kir-Anthel MAX





Gastroentéricos

BioEst-3V

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-001



Indicaciones:

BioEst-3V: Es un estimulante del apetito para cachorros y adultos que hayan padecido enfermedades bacterianas, virales o parasitarias que inhiben el apetito, ayuda a la pronta recuperación evitando la descompensación en el organismo y aumentando la ganancia de peso. Coadyuvante en el tratamiento post-operatorio. Además es un antihistamínico antagonista de la serotonina bloqueante de la H1 para el manejo del prurito y alergias dermatológicas en perros y gatos; su suplemento vitamínico coadyuva a la pronta recuperación de aquellos animales que se encuentran debilitados.

Dosis: Canino - 0.3 mg/kg de peso. **Felino** - de 2 mg/kg a 3.0 mg/kg por gato.

RioFst-3V

Contenido neto: 30 mi

BioEst 3V

Solución Oral

Complejo 8

DIOESI-3V			
	Dosis		
Caninos: Estin	nulante del apetito: 0.15 ml/kg de peso (0.3 mg/kg).		
Antihistamínio	co: 0.15 ml/kg de peso (0.3 mg/kg).		
Felinos: Estimu	Felinos: Estimulante del apetito: 1.5 ml por gato (3 mg/gato).		
Antihistamínico: 1 ml/kg de peso (2 mg/kg).			
Tiempo	Fórmula/Presentación		
cada 12 horas	Cada 100 ml contienen: Ciproheptadina		

Vía de Administración:

Kirón

Gastrozol

BioEst-3V: Oral.

Kirón

Gastrozol

Gastrozol

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-074, 075



Indicaciones:

Gastrozol: Inhibidor de la bomba de protones de las células parietales del estómago. Indicado para el tratamiento de hiperacidez gástrica, úlcera gástrica y duodenal, condiciones de acidez resistente a los bloqueadores de histamina H2. Para el tratamiento de la erosión gástrica inducida por AINES.

Dosis: 1 mg por kg de peso.

Gastrozol 5

	Dosis		
Car	Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 5 kg de peso.		
1	Tiempo	Fórmula/Presentación	
12 - d	cada 24 horas lurante 4 días	Cada tableta contiene: Omeprazol 5 mg Excipiente c.b.p 1 tableta Caja con 14 Tabletas.	

Gastrozol 20

	Dosis
Caninos y Felinos: 1 tableta por cada 20 kg de peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 12 - 24 horas durante 14 días	Cada tableta contiene: Omeprazol

Vía de Administración:

Gastrozol 5 y 20: Oral.



N-Emesis





Indicaciones:

N-Emesis: Está indicado en el control terapéutico y profiláctico de náuseas y vómito de origen central o periférico. Es un estimulante del tono gastrointestinal. Actúa en desórdenes de la motilidad gastrointestinal, reflujo gastroesofágico, gastritis por acidez, esofagitis, estasis gástrica y úlcera gástrica.

Dosis: 0.5 mg/kg.

N-Emesis

Dosis	
Caninos y Felinos: 1 ml (20 gotas) por cada 10 kg de peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 8 - 12 horas.	Cada ml contiene: Metoclopramida (Clorhidrato) 5 mg Vehículo c.b.p 1 ml Frasco con 15 ml.

Vía de Administración:

N-Emesis: Oral.



Fragancias



PERFECT PET

FRAGANCIAS DREAMS, MISTERY Y SECRETS

Dreams Aqua

Fragancia Unisex Tipo: Aqua Di Gio Frasco con 100 ml.

Mistery Active

Fragancia Macho Tipo: Polo Sport **Frasco con 100 ml.**

Mistery Home

Fragancia Macho Tipo: One Million Frasco con 100 ml.

Secrets Active

Fragancia Hembra Tipo: Bomshell **Frasco con 100 ml.**

Secrets Home

Fragancia Hembra Tipo: Pink **Frasco con 100 ml.**









Toallitas limpiadoras de orejas

NUMERO DE REGISTRO Q-0790-115



Toallitas limpiadoras de lágrimas









Indicaciones y modo de uso:

Permiten limpiar de manera segura las manchas que se forman alrededor del ojo (lágrima café). Son seguras y no irritan. Se pueden usar diariamente.

Lave perfectamente sus manos con agua y con jabón, tome una toallita y remueva la suciedad alrededor del ojo. Para mejores resultados procure repetir la limpieza diariamente.

Toallitas limpiadoras de lágrimas

Fórmula/Presentación

Cada toallita contiene: Cloruro de Cetrimonio al 29%, Cloruro de Sodio USP, Propilenglicol, Aloe Vera, Extracto incoloro de Manzanilla, Polisorbato 20, Paragón II y Agua Desmineralizada.

Bote con 30 Toallitas.

Vía de Administración:

Toallitas limpiadoras de lágrimas: Tópica.

Toallitas limpiadoras de dientes y encías

NUMERO DE REGISTRO Q-0790-113





Indicaciones y modo de uso:

Las toallitas limpiadoras de orejas permiten retirar de manera segura suciedad, cerilla o sustancias antes de que entren al canal auditivo. Deja limpias y sin olor las orejas del paciente. Seguro y efectivo en cachorros y perros adultos. Se pueden usar diariamente.

Tome una toallita y primero limpie con cuidado la parte interna de la oreja, sin entrar muy profundo en el oído. Presione ligeramente y pase la almohadilla suavemente mientras retira la suciedad y la cerilla hacia el borde externo del oído. En orejas muy sucias es posible que necesite repetir la limpieza de 2 a 3 veces.

Toallitas limpiadoras de orejas

Fórmula/Presentación

Cada toallita contiene: Ácido Salicílico 0.1 g

Vehículos Ácido Málico 0.15 g, Ácido Benzoico 0.1 g, Propilenglicol 5 g, Alcohol Etílico 96 USP 5 g, Polisorbato 20 1 g, Paragon II 0.11 g, Agua Desmineralizada 88.54 g c.b.p. 100 ml **Bote con 30 Toallitas.**

Vía de Administración:

Toallitas limpiadoras de orejas: Tópica.

Indicaciones y modo de uso:

Toallitas recomendadas para la limpieza diaria de dientes y encías. Mantienen una boca saludable y un aliento agradable, permiten la eliminación de las bacterias que forman la placa dentobacteriana y el mal aliento (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Micrococcus spp., Bacillus spp., Proteus spp., Escherichia spp., Alcaligenes spp., Pseudomonas spp., Porphyromonas spp., Fusobacterium spp., Prevotella spp., Peptostreptococcus spp. y Bacteroides spp.).

Tome la toallita entre sus dedos y limpie suavemente los dientes y las encías. Utilice toallitas adicionales si es necesario para limpiar toda la cavidad bucal.

Para obtener resultados efectivos se recomienda su uso diario.

Toallitas limpiadoras de dientes y encías

Fórmula/Presentación

Cada toallita húmeda impregnada con solución contiene: Clorhexidina Gluconato1.2 mg Vehículo c.b.p.1 ml

Bote con 30 Toallitas.

Vía de Administración:

Toallitas limpiadoras de dientes y encías: Oral.



Shampoo y Jabón Insecticida

REG: RSCO-PEC-INAC-0156-330-340-001, REG: RSCO-PEC-INAC-0156-328-323-001





Indicaciones y modo de uso:

Se recomienda para el control y tratamiento de infestaciones por ácaros, garrapatas, moscas, piojos y pulgas en perros. Por su acción repelente y su efecto residual protege a las mascotas hasta por 15 días contra pulgas (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) y piojos (Trichodectes canis) y hasta por siete días contra garrapatas (Rhipicephalus sanguineus y Dermacentor variabilis).

Moje al animal y aplique una cantidad suficiente de shampoo para cubrir todo su cuerpo (evite ojos y boca), forme espuma y deje actuar por 10 min. Posteriormente enjuague y seque al animal

En caso de infestaciones severas repita a los 3 días y posteriormente cada semana durante 4 semanas.

Shampoo Insecticida

Fórmula/Presentación
Permetrina
Ingredientes inertes: Detergente, limpiador, emoliente, fragancia, colorante, espesante, acidulante y vehículo

Jabón Insecticida

Fórr	mula/Presentación
Vehículo, perfume,	colorante y antioxidante 99.00 %
Barra de 100 g.	

Vía de Administración:

Shampoo insecticida: Tópica. Jabón insecticida: Tópica.



Kir@ftal AzitroKir

IÚMERO DE REGISTRO: O-0790-129







Indicaciones:

KirOftal AzitroKir: Es un antibiótico macrólido con condroitín sulfato, indicado para el tratamiento de la conjuntivitis y blefaritis bacteriana causada por cepas susceptibles de los siguientes microorganismos: Bacterias corineformes del grupo G, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis, Streptococcus pneumoniae y Chlamydia spp. Como auxiliar en el tratamiento de ojo seco.



Dosis:

KirOftal AzitroKir

	Dosis
Caninos y Felinos: Aplicar 1 gota en el ojo afectado.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 8 - 12 horas los primeros 2 días*	Cada ml contiene: Azitromicina Dihidratada equivalente a 10 mg de Azitromicina Sulfato de Condroitina100 mg Vehículo c.b.p1ml Frasco de 5 ml.

^{*}Después 1 gota cada 24 horas durante 5 días o a criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración:

KirOftal AzitroKir: Oftálmica exclusivamente.



NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-011





Kir oftal CiproXyn

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-132





Indicaciones:

KirOftal Genta: Es un antibiótico aminoglucósido, bactericida de amplio espectro, indicado en el tratamiento de infecciones de las estructuras oculares y sus anexos como: conjuntivitis, blefaritis, blefaroconjuntivitis y úlcera de la córnea. Útil en posoperatorio de cirugía ocular, así como en la prevención de infecciones causadas por traumatismos del ojo y cuerpos extraños que lesionen la córnea o conjuntiva.

Indicaciones:

KirOftal CiproXyn: Está indicado para el tratamiento de infecciones externas del globo ocular como conjuntivitis bacteriana y úlceras corneales causadas por microorganismos Gram-positivos y Gram- negativos susceptibles. El condroitín sulfato al 20% acelera la regeneración y la organización epitelial del estroma corneal.

Dosis:

KirOftal Genta

Dosis	
Caninos y Felinos: De 1 a 2 gotas dentro del saco conjuntival.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 4-6 horas	Cada ml contiene: Gentamicina base (como Sulfato de Gentamicina)3 mg Vehículo c.b.p1 ml Frasco de 12 ml.

KirOftal CiproXyn

Dosis	
Caninos, Felinos y Equinos (no destinados al consumo humano): Aplicar 1 gota en cada ojo.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 8,12 o 24 horas los primeros 2 días*	Cada ml contiene: Ciprofloxacina Clorhidrato 3 mg Sulfato de Condroitina 200 mg Vehículo c.b.p 1 ml Frasco de 5 ml.

^{*}Posteriormente aplicar 1 gota cada 12 - 24 horas por 5 días o a criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración:

KirOftal Genta: Oftálmica exclusivamente.

Vía de Administración:

KirOftal CiproXyn: Oftálmica exclusivamente.



Kir ftal Tobra

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-134





LagriVet SC

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-135





Indicaciones:

KirOftal Tobra: Está indicado en el tratamiento de las infecciones externas del ojo y sus anexos como blefaritis, conjuntivitis, queratoconjuntivitis, infección de córnea por *Staphylococcus* spp., así como coadyuvante en el tratamiento de infecciones intraoculares severas, causadas por bacterias susceptibles. Al igual que para la profilaxis prequirúrgica y posquirúrgica del ojo en perros y gatos.

Dosis:

KirOftal Tobra

	Dosis
Caninos y Felinos: Aplicar 1 gota en el ojo afectado.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 8 - 12 durante los primeros 2 días*	Cada ml contiene: Tobramicina

^{*}Posteriormente aplicar 1 gota cada 24 horas por 5 días o a criterio del Médico Veterinario.

LagriVet SC: Está indicado para el alivio temporal de resequedad debido a queratoconjuntivitis seca, blefaroconjuntivitis, queratitis por exposición, blefaritis, indicado también como coadyuvante de cualquier tratamiento tópico ocular para restablecer la calidad de la película lagrimal precorneal y recuperar su fisiología.

Dosis: LagriVet SC

Indicaciones:

Dosis	
Caninos y Felinos: Aplicar 1 o 2 gotas en el fondo del saco conjuntival del ojo afectado.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 4-6 horas*	Cada ml contiene: Sulfato de Condroitina

^{*}Tan frecuentemente como se requiera o a criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración:

KirOftal Tobra: Oftálmica exclusivamente.

Vía de Administración:

LagriVet SC: Oftálmica exclusivamente.



LagriVet NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-078









Indicaciones:

LagriVet: Es un ungüento oftálmico indicado para humectar y prevenir la irritación ocular, así como la falta de producción lagrimal o para prevenir la queratitis por exposición, también como coadyuvante durante la anestesia y procedimientos quirúrgicos.

Dosis:

LagriVet

Dosis	
Caninos y Felinos: Aplicar sobre la superficie del párpado.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
de 2 a 4 veces al día	Cada g contiene: Aceite Mineral



Indicaciones:

KirOftal Dexa: Está indicado en procesos inflamatorios y alérgicos sensibles a esteroides de conjuntiva bulbar y tarsal, párpados y segmento anterior del globo ocular, como: blefaroconjuntivitis alérgica y por contacto, queratoconjuntivitis, escleritis, queratoconjuntivitis primaveral y atópica, iritis, iridociclitis, queratouveítis, postoperatorio de cirugía intraocular (incluyendo la aplicación de láser) y rechazo de injerto corneal.

Dosis:

KirOftal Dexa

Dosis	
Caninos, Felinos y Equinos (no destinados al consumo humano): Aplicar 2 gotas en el saco conjuntival.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 4 - 6 horas*	Cada ml contiene: 21-Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 1 mg de Fosfato de Dexametasona Vehículo c.b.p. 1 ml Frasco de 5 ml.

*Una vez alcanzada una respuesta favorable disminuya la frecuencia de aplicación cada 6 - 8 horas o a criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración:

KirOftal Dexa: Oftálmica exclusivamente.



Kir@ftal KiroPred

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-131











Indicaciones:

KirOftal KiroPred: En traumatismos oculares e inflamación crónica del ojo; en el postoperatorio de catarata, glaucoma, córnea, conjuntiva y retina. En inflamaciones de origen alérgico. Agite antes de usar.

Dosis:

KirOftal KiroPred

Dosis	
Caninos y Felinos: Aplicar 1 a 2 gotas en el fondo del saco conjuntival inferior.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 6 horas*	Cada ml contiene: Acetato de Prednisolona 10 mg Vehículo c.b.p

^{*}O a criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración:

KirOftal KiroPred: Oftálmica exclusivamente.

Indicaciones:

KirOftal Diclo: Actúa como analgésico y antiinflamatorio de la región ocular ocasionada por cirugía del ojo o de sus tejidos anexos. Coadyuvante en conjuntivitis infecciosa, queratitis, queratoconjuntivitis, blefaroqueratitis.

Dosis:

KirOftal Diclo

Dosis	
Caninos y Felinos: Aplicar 2 gotas en el ojo afectado.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
de 3 a 4 veces al día*	Cada ml contiene: Diclofenaco Sódico

^{*}Dependiendo de la severidad del caso.

Vía de Administración:

KirOftal Diclo: Oftálmica exclusivamente.



Ciclosporin Ungüento

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-145





Indicaciones:

Ciclosporin Ungüento: Esta indicado para el tratamiento de Queratoconjuntivitis Crónica Seca, de Queratitis Superficial Crónica (Pannus), uveitis, episcleritis nodulares y necrotizantes. Para disminuir y/o eliminar cicatrices corneales, Queratitis eosinofílica en felinos, Conjuntivitis plasmocítica, Queratitis punteada superficial, Blefaritis ulcerativa del canto nasal y Escleritis.

Dosis:

Ciclosporin Ungüento

Dosis	
Caninos, Felinos y Equinos: Aplique una franja de 1 cm.*	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 12 horas	Cada g contiene: Ciclosporina

*Puede colocarse directamente sobre la córnea de el(los) ojo(s) afectado(s), o dentro del saco conjuntival dando un ligero masaje para facilitar la distribución del producto. La duración del tratamiento queda a criterio del **Médico Veterinario** según la evolución del caso.

Vía de Administración:

Ciclosporin Ungüento: Oftálmica exclusivamente.



de tu mejor amigo









Indicaciones:

KirOftal Ciclosporin: Está indicado para el manejo de Queratoconjuntivitis Crónica Seca, Queratitis Superficial Crónica (Pannus), uveítis, episcleritis nodulares y necrotizantes.

Dosis:

KirOftal Ciclosporin:

	Dosis	
	Caninos, Felinos y Equinos: Aplicar 1 gota sobre el ojo(s) afectado(s).	
Tie	empo	Fórmula/Presentación
h	da 12 oras Irante emanas*	Cada ml contiene: Ciclosporina

^{*}O a criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración:

KirOftal Ciclosporin: Oftálmica exclusivamente.



Indicaciones:

KirOftal NeoDex: En afecciones inflamatorias del segmento anterior del ojo o de sus anexos y en complicaciones infecciosas causadas por gérmenes sensibles a la Neomicina. Como en los casos de: queratitis superficial, queratitis profunda sin daño en córnea, queratitis infecciosa, conjuntivitis infecciosas y alérgicas, iritis aguda, iridociclitis, uveítis anterior, blefaritis incluyendo la infecciosa y alérgica.

Dosis:

KirOftal NeoDex:

Dosis		
Caninos y Felinos: Aplicar 2 gotas en el saco conjuntival.		
Tiempo	Fórmula/Presentación	
cada 2 horas*	Cada ml contiene: 21-Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 1.0 mg de Fosfato de Dexametasona, Sulfato de Neomicina equivalente a 3.5 mg de Neomicina base Vehículo c.b.p 1 ml Frasco de 5 ml.	

*Una vez alcanzada una respuesta favorable disminuya la frecuencia de aplicación cada 4 horas o a criterio del Médico Veterinario.


Vía de Administración:

KirOftal NeoDex: Oftálmica exclusivamente.



Anatomía del ojo en caninos y felinos









Kirche Kirched Robert Record Robert Record R

ANTIBIÓTICO CON ANTIINFLAMATORIO

















INMUNOMODULADOR, ANTIINFLAMATORIO Y
ESTIMULANTES MUCINOACUOSOS

KirOtic 4L

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-014



Officos



Indicaciones:

KirOtic 4L: Es un bactericida, fungicida, antiinflamatorio y analgésico que actúa en otitis media aguda y otitis supurativa crónica. Por la acción de la dexametasona, ayuda a desinflamar la mucosa ótica. Actúa contra bacterias Gram-positivas y Gram-negativas como: *Proteus* spp., Staphylococcus spp., Pseudomona spp., Streptococcus spp. Por su contenido de ketoconazol es efectivo contra la Malassezia pachydermatis.

Dosis:

KirOtic 4L:

Dosis		
Caninos y Felinos: Aplicar 2 a 3 gotas dentro del conducto auditivo.		
Tiempo	Fórmula/Presentación	
cada 6 horas durante 5 - 10 días*	Cada ml contiene: Ketoconazol	

^{*}Dependiendo de la severidad del caso.

Vía de Administración:

KirOtic 4L: Ótica exclusivamente.

KiroSeptic Complete

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-124



Indicaciones:

KiroSeptic Complete: Es un agente no irritante para la limpieza de oído externo. Sus propiedades antisépticas y queratolíticas ayudan a eliminar el exceso de cerumen, detritus celular y exudado. Útil para la limpieza de rutina del oído externo y del actividad de la citica de la canal auditivo o como tratamiento preventivo de la otitis externa en aquellos animales con predisposición a presentarla. Puede utilizarse previo a la aplicación de un tratamiento específico.

Dosis:

KiroSeptic Complete:

Dosis

Caninos y Felinos: Aplique cantidad suficiente del producto en el canal auditivo proporcionando un masaje ligero en la base de la oreja, espere unos minutos y posteriormente limpie la zona, por último elimine el exceso de producto con una torunda de algodón.

Tiempo	Fórmula/Presentación
Dos o tres veces por semana a criterio del Médico Veterinario	Cada 100 ml contienen: Digluconațo de Clorhexidina 0.15 g Vehículo (Ácido Salicílico, Ácido Láctico) c.b.p 100 ml Frasco de 100 ml.

Vía de Administración:

KiroSeptic Complete: Ótica exclusivamente.







Suplementos Nutricionales







PERFORMANCE Calcio

Suplemento nutricional a base de calcio



Indicaciones:

PERFORMANCE Calcio: Está indicado como suplemento en las deficiencias de calcio, fósforo y vitamina D3 en perros y gatos en crecimiento, animales geriátricos, anoréxicos, para hembras gestantes y perros de guardia y protección.

Dosis:

PERFORMANCE Calcio

Dosis	
Caninos y Felinos: 1 tableta para animales mayores a 10 kg. ½ tableta para animales de menor peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas hasta su recuperación	Cada tableta contiene: Calcio

Vía de Administración:

PERFORMANCE Calcio: Oral. Se puede mezclar con el alimento.

PERFORMANCE

Condroprotector Vitaminado

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-119



Indicaciones:

PERFORMANCE Condroprotector: Coadyuvante en el mantenimiento de la funcionalidad de las articulaciones del perro. Está recomendado en perros, como preventivo en cachorros de razas predispuestas a enfermedad articular degenerativa, desgaste articular físico debido a sobre peso, ejercicio elevado o edad avanzada, artrosis, artritis traumática y posoperatoria, otoplastia estética, cirugía articular o de tendones. Auxiliar en la regeneración de fracturas, displasia de cadera, espondilosis y espondiloartrosis, osteítis, osteocondritis disecante y osteocondrosis, síndrome del carpo laxo. También posee un efecto restaurador dérmico, fortalece las uñas y la estructura del pelo.

Dosis: 24 mg/kg P.C. de Condroitin Sulfato, 40 mg/kg P.C. de Glucosamina Sulfato, 4 mg/kg P.C. de Sulfato de Manganeso.

PERFORMANCE Condroprotector

Dosis		
Caninos: 1 tab ½ tableta para	Caninos: 1 tableta para animales mayores a 10 kg. ½ tableta para animales de menor peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación	
cada 24 horas	Cada tableta contiene: Condroitín Sulfato	

*La dosis puede modificarse según el criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración:

PERFORMANCE Condroprotector: Oral. Por su delicioso sabor se puede mezclar con el alimento.



PERFORMANCE Ages

Suplemento multivitamínico con Omega 3 y 6





PERFORMANCE

Reconstituyente

Suplemento multivitamínico y mineral





Indicaciones:

PERFORMANCE Ages: Es un suplemento multivitamínico, mineral, con Omega 3 y 6. Indicado para perros adultos y seniles, con necesidades nutricionales especiales, manteniendo el brillo, salud y sedosidad del pelo, evitando la muda excesiva.

Dosis:

PERFORMANCE Ages

Dosis			
Caninos: 1 tab	Caninos: 1 tableta para animales mayores de 10 kg de peso.		
Tiempo	Fórmula/Presentación		
cada 24 horas	Cada tableta contiene: Acidos grasos Omega 3		

Vía de Administración:

PERFORMANCE Ages: Oral. Se puede mezclar con el alimento.

Indicaciones:

PERFORMANCE Reconstituyente: Es un suplemento multivitamínico y mineral. Indicado para perros con necesidades nutricionales especiales, hembras gestantes o lactantes, perros activos, de guardia y protección o de cacería. Aumenta la energía y desarrollo corporal de cachorros en crecimiento y perros de trabajo.

Dosis:

PERFORMANCE Reconstituyente

Dosis		
Caninos: 1 tableta para animales mayores de 10 kg de peso. 1/2 tableta para animales de menor peso.		
Tiempo	Fórmula/Presentación	
cada 24 horas	Cada tableta contiene: Vitamina A (Retinol)	

Vía de Administración:

PERFORMANCE Reconstituyente: Oral. Se puede mezclar con el alimento.



Especialidades



Deter

Auxiliar en el tratamiento de la coprofagia



Indicaciones:

Deter: Ayuda a disuadir al perro adulto y/o cachorro, del hábito indeseable de la coprofagia, ya sea causado por motivos nutricionales, patológicos o comportamentales, mediante la modificación de las características organolépticas de las excretas.

Dosis:

Deter 5

Dosis	
Caninos: Menores de 5 Kg = 1 tableta. De 6 a 10 kg = 2 tabletas. De 11 a 15 Kg = 3 tabletas. De 16 a 20 kg = 4 tabletas.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas	Cada tableta contiene: Glutamato monosódico 200 mg Extracto de Yucca schidigera14 mg Vitamina B1 (Tiamina HCI)0.2 mg Oleorresina de pimentón 0.08 mg Excipiente c.b.p

Deter 20

Dosis		
Caninos: De 10 a 20 kg = 1/2 tableta. Más de 20 Kg = 1 tabletas.		
Tie	mpo	Fórmula/Presentación
	da 24 oras	Cada tableta contiene: Glutamato monosódico

Vía de Administración:

Deter: Oral.



Dental Plus

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-147



Indicaciones:

Dental Plus: está indicado como tratamiento preventivo de periodontitis bacteriana canina y felina asociada con: *Staphylococcus intermedius, Staphylococcus spp., Malassezia (Pityrosporum)* pachydermatis.

Dosis:

Dental Plus

Dosis	
Caninos y Felinos: Aplicar un centímetro de pasta sobre el cepillo.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
una vez al día, dos veces a la semana*	Cada 100 g contienen: Digluconato de Clorhexidina 0.12 g Excipiente c.b.p 100 g Tubo con 90 g.

*O a criterio del Médico Veterinario.

Vía de Administración:

Dental Plus: Tópica dental.









¿TU PERRO COMIÓ... QUÉ?

La COPROFAGIA CANINA es el término utilizado para referir el desagradable hábito del perro en el consumo de heces propias o de otra especie. ¿Sabes por qué tu mascota lo hace?

HAY VARIAS **RAZONES**

POR LAS CUALES UN PERRO PUEDE COMER SUS HECES:

PATOLÓGICAS

Síndrome de Cushing. Síndrome de malabsorción intestinal. Parasitosis (coccidiosis). Diabetes Mellitus

NUTRICIONALES

Deficiencias en minerales y vitaminas como la Tiamina y/o Cobalamina.

COMPORTAMENTALES

Comportamiento exploratorio. Imitación de la madre. Estrés. Hambre. Heces palatables (de gato u otro animal sobrealimentado).



RAZAS GRANDES



SABÍAS OUÉ...

LA DESCRIPCIÓN DE LAS HECES DE TU PERRO PUEDE AYUDAR AL MÉDICO VETERINARIO A IDENTIFICAR EL PADECIMIENTO DE TU MASCOTA Y A SOLUCIONAR LA COPROFAGIA.

NEGRA



POSIBLE HEMORRAGIA

CON PUNTOS BLANCOS



ACUOSA



COMIÓ PASTO O HIERBA. TIENE PARÁSITOS O



AL FRGIA PARÁSITOS OINTESTINO ALERGIA.

BLANCA



EXCESO DE CALCIO O ALIMENTO



PROBLEMAS EN EL PÁNCREAS O EN EL HIGADO.

SANGRE





CONTAMOS CON PRESENCIA EN:





Av. Sor Juana Inés de la Cruz N° 582, Col. Benito Juárez, Estado de México, C.P. 57000



ventas@kironmexico.com



kironmexico.com



Tel.: 55 5112 7743

Visita nuestro sitio web



Para uso del Médico Veterinario.