



Cuidando la salud
de tu mejor amigo

Shampoo y Jabón Insecticida

REG: RSCO-PEC-INAC-0156-330-340-001



Ectoparasiticida efectivo en la eliminación de pulgas y garrapatas

INGREDIENTE	ACTIVO:
Permetrina.....	1.00%
3-fenoxibencil (1RS, 3RS, 1RS,3SR)3- (2,2-diclorovinil-2, 2- dimetil- ciclopropano carboxilato (Equivalente a 10 g I.A./L 20°C)	
Detergente, limpiador, emoliente, fragancia, colorante, espesante, acidificante y vehículo.....	99.00 %
Total.....	100.00 %

Presentación: shampoo 370 mL jabón de 100 g




INDICACIONES:

Se recomienda para el control y tratamiento de infestaciones por ácaros, garrapatas, moscas, piojos y pulgas en perros. Por su acción repelente y su efecto residual protege a las mascotas hasta por 15 días contra pulgas (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*) y piojos (*Trichodectes canis*) y hasta por siete días contra garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus* y *Dermacentor variabilis*).

La permetrina es un piretroide sintético es un éster carboxílico, cuyo mecanismo de acción es la neurotoxicidad por prolongación de la activación de los canales de sodio, causa una despolarización sostenida provocando parálisis y muerte de insectos. No surte efectos sobre las neuronas de mamíferos ni aves por lo que tiene poca toxicidad en mamíferos, con la excepción de gatos donde se puede encontrar reacciones de hipersensibilidad.

La absorción de la permetrina es insignificante en aplicación tópica.

La permetrina es un desparasitante externo contra piojos, garrapatas, pulgas, ácaros y otros artrópodos por contacto, de aplicación tópica en mascotas se utiliza en el tratamiento de las infestaciones por *Ctenocephalides canis*, *C. felis*, *Sarcoptes scabiei*, *musca doméstica*.



Este piretroide ofrece varias ventajas, como son su alto poder de derribo, rápida degradación (baja residualidad), que evita la contaminación del medio ambiente, poseen baja tendencia a la bioacumulación (en el cuerpo) son de baja toxicidad para las aves y animales domésticos.

Toxicidad: la permetrina no fue mutagénica cuando se evaluó en varios estudios "in vitro" y de toxicidad genética "in vivo".

Seguridad

- **LD50 oral aguda ratas*:** 430-4000 mg/kg según el vehículo y el contenido en diferentes isómeros.
- **LD50 dermal aguda ratas*:** >4000 mg/kg

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

La permetrina se debe utilizar con precaución en pacientes con hipersensibilidad a otros piretroides sintéticos, a piretrinas de los crisantemos. Productos que contienen permetrina son sólo para uso externo. No se deben administrar por vía oftálmica u otra vía no mencionada. Si el producto entra en los ojos, lave inmediatamente con agua. No tratar



**Cuidando la salud
de tu mejor amigo**

con este producto hembras gestantes o lactantes. No usar en gatos. En caso de reacción alérgica suspender su uso. No utilizar en animales enfermos, convalecientes, ni en cachorros menores de 12 semanas de edad.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LAVASE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: Piretroides Sintéticos.

SÍGNOS DE INTOXICACIÓN: Por ingestión de grandes cantidades de este insecticida se pueden presentar hormigueo transitorio de la boca, náusea, vómito, dolor de cabeza y vértigo.

TRATAMIENTO: No hay antídoto. En caso de ingestión se sugiere el lavado gástrico, previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. Si se presentan signos nerviosos se sugiere la administración de terapia de sostén y Diazepam e inclusive fenobarbital hasta la desaparición de los signos.

INSTRUCCIONES DE USO:

Para uso externo solamente. Usando guantes, moje al animal con agua templada, aplique el shampoo y frote hasta obtener abundante espuma, déjelo actuar por 10 minutos y enjuague con abundante agua.

VÍA DE ADMINISTRACION:

Tópica

ADVERTENCIAS:

Consérvese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

No se deje al alcance de los niños y animales domésticos.

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.

Literatura exclusiva para Médicos veterinarios.

Responsables de contenido: Departamento Técnico.

glopez@petspharma.com.mx